

Рассмотрена и одобрена на заседании
Ветбиофармсовета
Протокол №67 «15» июля 2013 г.

Инструкция по применению препарата Альбендатим - 200; - 500

1 Общие сведения

- 1.1 Альбендатим -200; -500 (Albendatimum -200; -500).
 - 1.2 Активнодействующим веществом является альбендазол.
 - 1.3 Препарат представляет собой таблетки круглой формы, серого или серого с кремовым оттенком цвета. В каждой таблетке содержится 200 мг или 500 мг альбендазола.
 - 1.4 Препарат выпускают по 50, 100, 250, 500 и 1000 штук в одинарных пакетах из полиэтиленовой пленки и в непрозрачной полимерной таре. Таблетки хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.
- Срок годности препарата - 2 года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

2 Фармакологические свойства

- 2.1 Альбендазол-5-(пропил-тио)-1-п-бензимидазол-2-ил-карбамат, относится к группе бензимидазолов и обладает широким спектром противопаразитарного действия, эффективен в отношении взрослых и неполовозрелых нематод желудочно-кишечного тракта и легких, цестод и трематод, против взрослых фасциол.
- 2.2 Механизм действия заключается в нарушении метаболизма, угнетении активности фураматредуктазы и синтеза АТФ паразита, что приводит к гибели гельминтов.
- 2.3 Примерно 50% альбендазола всасывается в пищеварительном тракте животных, метаболиты его выделяются в основном с мочой.

3 Порядок применения

- 3.1 Препарат применяют свиньям, крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям и собакам при гельминтозах, однократно перорально, индивидуально или групповым способом (предварительно измельчив), в смеси с концентрированными кормами. При необходимости препарат животным можно применять повторно через 2 недели.

Дозы применения препарата

Таблица 1.

Вид животного и название гельминтозов	Альбендатим - 200	Альбендатим - 500
1 Крупный рогатый скот: - фасциолез, парамфистоматидоз, мониезиоз, диктиокаулез, телязиоз, стронгилятозы желудочно - кишечного тракта, стронгилоидоз, трихоцефалез	-	по 1 таблетке на 50 кг массы тела
2 Лошади: - анаплацефалидоз, параскаридоз, телязиоз, оксиуроз, стронгилятоз, стронгилоидоз	-	по 1 таблетке на 50 кг массы тела
3 Мелкие жвачные: - фасциолез, мониезиоз, диктиокаулез, стронгилятозы желудочно - кишечного тракта, стронгилоидоз, трихоцефалез	по 0,5 таблетки на 10 кг массы тела	-
4 Свиньи: - аскаридоз, оллуланоз, трихоцефалез, эзофагостомоз, метастронгилез, стронгилоидоз	по 0,5 таблетки на 13 кг массы тела	-
5 Собаки и пушные звери: - описторхоз, токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, тениоз	по 1 таблетке на 10 кг массы тела	-

- 3.2 При применении препарата в рекомендуемых дозах побочных явлений не

наблюдается.

3.3 Препарат не разрешается применять самкам во время беременности и лактации, а также ослабленным, истощенным и больным инфекционными болезнями животных.

3.4 Перед массовыми обработками каждую партию препарата испытывают на небольших группах животных (5-15) различной упитанности и возраста. Если у животных в течение 2 суток после обработки не отмечены признаки токсикоза, приступают к обработке всего поголовья.

3.5 Мясо животных можно использовать для пищевых целей через 14 дней, молоко – через 4 дня после дегельминтизации.

4 Меры личной профилактики

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать меры личной гигиены и технику безопасности при работе с ветеринарными препаратами.

4.2. После окончания работы с препаратом необходимо тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью "ТМ" (Республика Беларусь), 220000, г. Минск, ул. Скрыганова, д.6, к.1016а.

Инструкция по применению препарата Альбендатим- 200;- 500 разработана заведующим отделом паразитологии РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» профессором М.В. Якубовским.

