

Рассмотрена и одобрена на заседании
Ветбиофармсовета
"19 " марта 2014 г. Протокол № 71.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата ветеринарного "Ампровет"

1 Общие положения

1.1 Ампровет (Amprovetum).

1.2 Препарат представляет собой однородный порошок от белого до светло-желтого цвета, содержащий 25 % ампролиума и наполнитель лактозу или глюкозу.

1.3 Препарат выпускают по 0,1; 0,5 и 1,0 кг в двойных пакетах из полиэтиленовой пленки, полимерных пакетах или полимерной таре.

1.4 Срок годности-3 года. Хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0 до плюс 25°C при соблюдении условий хранения.

2 Фармакологические свойства

2.1 Ампролиума гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает широким спектром эймериостатического действия, влияет на метаболизм углеводов путем конкуренции с тиаминном.

2.2 Препарат эффективен в отношении различных видов эймерий: *E.maxima*, *E.acervulina*, *E.mitis*, *E.tenella*, *E.necatrix*, *E.brunetti*.

2.3 При оральном введении препарат плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, оказывая противоэймериозное действие на слизистой и подслизистой оболочке.

2.4 Основная часть препарата выводится из организма в неизменном виде с фекалиями, а у кур-несушек частично с яйцами.

2.5 По токсичности препарат относится к IV классу-малоопасным веществам.

3 Порядок применения препарата

3.1 Препарат применяют для лечения молодняка кур и индеек при эймериозе из расчета 1000 г препарата на 1 тонну сухого корма (3-5) дней подряд, а затем с (4-6) дня в дозе 500 г на 1 тонну корма в течение 14 дней. Препарат равномерно смешивают с кормом, сначала перемешивая с небольшим количеством корма, а затем с остальной его частью. С водой препарат применяют из расчета 20 г препарата на 10 л питьевой воды в течение (5-10) дней. С профилактической целью цыплятам препарат применяют, начиная с (7-15)-дневного возраста ежедневно в течение (50-60) дней из расчета 50 г препарата на 100 кг сухого корма или 5 г препарата на 10 л питьевой воды.

3.2 Побочные действия: в рекомендованных дозах препарат не вызывает побочных эффектов.

3.3 Противопоказания. Не рекомендуется одновременное использование препарата с другими эймериостатиками также ремонтному молодняку кур после 16-недельного возраста и курам-несушкам.

3.4 Убой птицы на мясо разрешается не ранее чем через 5 суток после последнего применения препарата.

4 Меры личной профилактики

4.1 Во время применения препарата следует соблюдать правила личной гигиены и технику безопасности при работе с ветеринарными препаратами.

4.2 После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью "ТМ" (Республика Беларусь). 220000, г. Минск, ул. Скрыганова, д.6, к.1016 а.

Инструкция разработана сотрудниками РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» (Насонов И.В., Захарик Н.В.).

