

Рассмотрена и одобрена на заседании
Ветбиофармсовета
Протокол №67 от "15" июля 2013 г.

Инструкция по применению
препарата Ферровит

1 Общие сведения

1.1 Ферровит (Ferrovitum).

1.2 Препарат представляет собой стерильную жидкость красно - бурого цвета. Допускается выпадение осадка. В 1 мл препарата содержится 19,0 мг железа (в виде декстрана) и 0,5 мкг витамина В₁₂.

1.3 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 100,0 и 200,0 мл. Хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 2°С до плюс 25°С.

1.4 Срок годности препарата - 2 года от даты изготовления при соблюдении условий хранения. После вскрытия флакона препарат должен быть использован в течение 24 ч.

2 Фармакологические свойства

2.1 Препарат обладает антианемическим действием. Входящее в состав железо, после включения в процессы метаболизма, стимулирует кроветворение. Витамин В₁₂ также положительно влияет на гемопоэз, повышает эффективность использования железа и энергию роста поросят.

3 Порядок применения препарата

3.1 Препарат применяют свиньям с целью профилактики и лечения алиментарной анемии, нормализации обмена веществ, повышения сохранности и интенсивности роста молодняка.

3.2 Препарат применяют внутримышечно. Поросятам - сосунам назначают дважды: в 3 - 5 и 10 - 14 дневном возрасте в дозе 4 - 5 мл на инъекцию. Подсвинкам, взрослым свиньям и свиноматкам (за 2 - 4 недели до опоросов) препарат вводят в количестве 10 - 20 мл. При необходимости препарат назначают повторно в той же дозе через 7 - 10 дней. В одно место инъекции животному можно вводить не более 10 мл препарата.

3.3 Следует соблюдать осторожность при назначении препарата поросятам со значительным дефицитом витамина Е и селена.

3.4 Побочные действия. При применении препарата у животных возможно появление расстройств деятельности желудочно-кишечного тракта (диарея, запор), тахикардия, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, эритема).

3.5 Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. Не следует применять препарат при недостатке витамина Е, в комбинации с тетрациклином и сульфадиазином

3.6 После назначения препарата убой животных на мясо разрешается без ограничений.

4 Меры личной профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью "ТМ".
(Республика Беларусь). 220000, г. Минск, ул. Скрыганова, д.6, к.1016 а.

Инструкция по применению препарата Ферровит разработана сотрудниками РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышеслесского" Кучинским М.П., Кучинской Г.М. и ООО «ТМ» Кисиним А.Л.

